

Versión 002
Fecha 02/12/2024

Nombre del producto

INITIALE

Características del producto

Initiale es un fertilizante líquido nitrogenado de liberación controlada libre de nitratos. El producto presenta más de la mitad del nitrógeno en forma de polímeros de urea formaldehído de longitud media que garantizan el aporte progresivo y una alta eficacia del nitrógeno aportado. Gracias a su formulación, el nitrógeno aplicado es fácilmente absorbido y asimilado por el cultivo tanto por vía foliar como radicular. Tras su aplicación, el nitrógeno proveniente de la urea formaldehído es liberado gradualmente durante 8-10 semanas.

Composición

Abono CE

Nitrógeno Total (N) 28% p/p; Nitrógeno Ureico 11,5% p/p; Nitrógeno de Urea formaldehído 16,5% p/p

Presentación

Categoría	Formato	Uds./caja	Uds./palet
Nutrientes	10 L	-	660

Recomendaciones de uso

COMPATIBILIDAD:

El producto se puede mezclar con la mayoría de productos fitosanitarios del mercado, no es compatible con productos muy ácidos, ni con soluciones que contengan nitrato amónico, tebuconazol a temperaturas superiores a 25°C ni con Fosetil-Al. Dada la gran cantidad de productos fitosanitarios del mercado, se aconseja hacer una mezcla previa para ver la compatibilidad. Llenar el tanque hasta la mitad del agua indicada, verter la cantidad del producto requerida al tanque de pulverización con el agitador en marcha, añadir si es el caso los otros productos fitosanitarios y aplicar a continuación.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Para Olivo, Cítricos, Frutales, Maíz, Hortícolas, Cereales y Praderas.

Dosis foliar:

- Olivo: 5-10 L/Ha. Antes de la floración y repetir cada 30 días.
- Cítricos: 5-10 L/Ha. En diciembre, diferenciación floral, inicio de la brotación y después del cuajado
- Frutales: 5-10 L/Ha. Antes del cuajado y repetir cada 30 días

La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes

- Vid: 5-10 L/Ha. Tratamiento post-floración.
- Hortalizas y Fresa: 5-10 L/Ha. Inicia en floración y aplicaciones cada 10-14 días.
- Cereales: 10-25 L/Ha. Primer tratamiento entre pleno ahijado hasta primer nudo. Segundo tratamiento entre hoja bandera y floración. En el caso de maíz, hacer un tratamiento en post-emergencia
- Pradera o césped: 15-25 L/ha. Hasta 4 aplicaciones por año.

Dosis fertirrigación:

- Olivo, Cítricos y Frutales: 60-120 L/Ha. Final del invierno, desde reactivación vegetativa.
- Vid: 40-80 L/Ha. Final del invierno, desde reactivación vegetativa.
- Hortalizas de fruto: 40-80 L/Ha. Al inicio del ciclo vegetativo.

PRECAUCIONES:

Deberán evitarse temperaturas por debajo de -5°C y por encima de 30°C así como los cambios bruscos de temperatura. Se recomienda usar el producto dentro de los 12 meses siguientes a su adquisición. Instituto Nacional de Toxicología (24h), Tel: 915 620 420.

Plazo de seguridad y LMRs

No procede

GESTIÓN DE ENVASES

Es obligatorio enjuagar enérgicamente tres veces, o mediante dispositivo de presión, cada envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al tanque del pulverizador. No abandone este envase, deposítelo en los puntos de recogida designados por SIGFITO, o entréguelo a un gestor autorizado.



La información contenida en este documento no dispensa de la lectura de la etiqueta y la ficha de datos de seguridad correspondientes