



Brutus[®] Active

HERBICIDA



Nueva Formulación Flow



Brutus® Active



Herbicida selectivo contra gramíneas y dicotiledóneas anuales

Brutus® Active es un herbicida selectivo a base de pendimetalina, formulado en forma de suspensión concentrada, para el **control de malas hierbas anuales en pre-emergencia o post-emergencia precoz**.

Al estar **formulado en forma de SC**, el manchado y olor que desprende el formulado es menor que en los productos tradicionales EC.

Su persistencia en el suelo es del orden de 3 meses.

Entre las especies de malas hierbas sensibles a **Brutus® Active** se encuentran:

Gramíneas: *Alopecurus myosuroides*, *Digitaria sanguinalis*, *Echinochloa crus-galli*, *Setaria spp.*, *Panicum dichotomiflorum*.

Dicotiledóneas: *Amarathus spp.*, *Atriplex spp.*, *Heliotropium europaeum*, *Capsella bursa-pastoris*, *Chenopodium album*, *Euphorbia spp.*, *Fumaria spp.*, *Myosotis arvensis*, *Mercurialis annua*, *Papaver rhoeas*, *Portulaca oleracea*, *Polygonum spp.*, *Solanum nigrum*, *Thlaspi arvenses*, *Urtica urens*, *Veronica spp.*

Recomendaciones de uso:

- Aplicar en pulverización a baja presión dirigida al suelo, mediante tractor o manualmente en pulverización normal, con el suelo bien preparado y limpio de malas hierbas.
- Realizar una única aplicación por campaña con un volumen de caldo de 200-400 l/ha. La dosis máxima en cultivos destinados a forraje será de 2,5 l/ha.
- Evitar la deriva a plantas y cultivos colindantes.
- Para evitar la aparición de resistencias siga las recomendaciones de la etiqueta y utilice herbicidas con diferente modo de acción.

Plazo de seguridad: En achicoria, endivia y lechuga 75 días. No procede establecerlo para el resto de cultivos

Composición:

Pendimetalina 40% p/v [400 g/l] (38% p/p)
Suspensión concentrada (SC)

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº ES-00064

Cultivo	Malas hierbas controladas	Dosis (l/ha)	Forma y época de aplicación
Achicoria, Endibia y Lechuga	Malas hierbas anuales	2,5-4	Pre-emergencia o pre-trasplante
Algodonero		3,3-5	Pre-emergencia del cultivo
Cítricos Frutales de hoja caduca		3,3-4,5	Aplicar entre líneas desde la recolección hasta la fijación del fruto de la campaña siguiente
Coliflor		2,5-4	Pre-trasplante
Garbanzo, habas para grano, Guisantes, Judías para grano y judías verdes		3-5	Pre-emergencia del cultivo
Girasol		2-5	Pre-emergencia del cultivo
Maíz y Patata		3-4	Pre-emergencia del cultivo
Pimiento		3,3-4	Pre-emergencia o pre-trasplante
Soja		2,5-5	Pre-emergencia del cultivo
Vid		3,3-5	Durante la parada invernal en estado de yema dormida
Viveros de frutales			Pre o post-trasplante de las estaquillas
Zanahoria		2,5-4	Pre-emergencia del cultivo
Tabaco	Malas hierbas anuales	3-4	Pre-trasplante
	Deshijado	3,7-6,2	Al aparecer las primeras flores a razón de 20ml/planta

