




**Borneo**<sup>®</sup>

**ACARICIDA ESPECÍFICO CON ACCIÓN TRANSLAMINAR**



**La elección más inteligente**  
contra ácaros tetraníquidos



**KENOGARD**  
CULTIVAMOS LA INVESTIGACION • 研究深耕



## ACARICIDA ESPECÍFICO CON ACCIÓN TRANSLAMINAR

**Borneo®** es un acaricida de contacto, específico para ácaros tetraníquidos (*Tetranychus urticae*, *Panonychus ulmi*,...) con registro en **albaricoquero, cerezo, ciruelo, manzano, melocotonero y nectarino, membrillero, níspero**

Pertenciente a la familia de las difenoxazolinás, posee una excelente actividad ovicida y larvicida, y se caracteriza por su gran eficacia a dosis bajas, así como por una marcada acción persistente.

**Borneo®** es un regulador del crecimiento de los ácaros, con actividad por contacto e ingestión, afectando a huevos y a estados inmaduros de las especies sensibles. Además, induce la esterilización de las hembras adultas, con lo que sus puestas ya no resultarán viables.

**Borneo®** presenta unas favorables características toxicológicas, ecotoxicológicas y medioambientales.

**Borneo®** posee acción translaminar y presenta resistencia al lavado, al ser rápidamente absorbido por los tejidos foliares.


**Borneo®** está inscrito en el R.O.P.F. con el número 23.433

### Recomendaciones de uso en Frutales

Aplicar en pulverización normal al inicio de la infestación. Aplicar de 25 a 50 ml/hl, con un máximo de 0,5 l/ha. Se recomienda no realizar más de un tratamiento con **Borneo®**, ni con ningún otro producto que contenga Etoxazol, por período vegetativo, para evitar la aparición de resistencias

### Aplicaciones y dosis autorizadas

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	PLAZO DE SEGURIDAD
Cerezo y Ciruelo	Ácaros Tetraníquidos	25-50 ml/hl	3 días
Albaricoquero, Melocotonero y Nectarino			14 días
Manzano, Membrillero y Níspero			28 días



Distribuido por:



Diputación, 279 - 08007 BARCELONA  
Tel. 934 881 270 - [www.kenogard.es](http://www.kenogard.es)